

USG jamy brzusznej

3 i 2 dni przed badaniem

- po każdym posiłku zażyć 2 kapsułki Espumisanu lub Esputikonu

Dzień poprzedzający badanie

- należy unikać spożywania produktów powodujących powstanie nadmiernej ilości gazów, takich jak: napoje gazowane, świeże warzywa i owoce, kasze czy świeże pieczywo, ciężkostrawne potrawy, jajka
- po każdym posiłku zażyć 2 kapsułki środka ułatwiającego wydalanie gazów jelitowych (osoby otyłe 3 kapsułki)
- nie należy stosować lewatywy
- ostatni posiłek zjeść nie później niż o godzinie 18.00

Dzień badania

W przypadku, gdy odbywa się ono w godzinach porannych - na badanie należy zgłosić się na czczo, nie należy nic jeść ani pić, palić papierosów i zażyć tylko niezbędne leki.

W przypadku, gdy odbywa się ono w godzinach popołudniowych - należy powstrzymać się od jedzenia 6 godzin przed zabiegiem.

Należy także:

- rano zażyć 2 kapsułki środka ułatwiającego wydalanie gazów jelitowych
- zadbać o wypróżnienie
- pić tylko tyle, by ugasić pragnienie.

Nie należy oddawać moczu przed badaniem.

USG jamy brzusznej z oceną pęcherza moczowego

W dniu badania należy być na czczo z pełnym pęcherzem moczowym. Należy wypełnić pęcherz moczowy pijąc nieduże ilości płynów przez 3-4 godziny.

USG jamy brzusznej z oceną odźwiernika

Przed badaniem należy być 2-3 godziny na czczo.

USG piersi

Badanie USG piersi nie wymaga żadnego przygotowania i można je wykonać w dowolnej fazie cyklu miesięcznego, o ile lekarz kierujący nie zalecił inaczej (w takiej sytuacji na badanie należy się zgłosić we wskazanej fazie cyklu). Jedynie u kobiet, które skarżą się na tkliwość piersi przed miesiączką, zaleca się wykonanie tego badania w pierwszej połowie cyklu.

USG innych narządów

Nie wymagają specjalnego przygotowania.

Familijne Centrum Medyczne Fundacji „Pomóż Im”
Mazowiecka 33, 15-369 Białystok