

Przygotowanie do badań USG dzieci



Familiijne Centrum Medyczne
Fundacji „Pomóż Im”

USG jamy brzusznej

3 i 2 dni przed badaniem

- po każdym posiłku zażyć 2 kapsułki Espumisanu lub Espotikonu

Dzień poprzedzający badanie

- należy unikać spożywania produktów powodujących powstanie nadmiernej ilości gazów, takich jak: napoje gazowane, świeże warzywa i owoce, kasze czy świeże pieczywo, ciężkostrawne potrawy, jajka
- po każdym posiłku zażyć 2 kapsułki środka ułatwiającego wydalanie gazów jelitowych
- nie należy stosować lewatywy
- ostatni posiłek zjeść nie później niż o godzinie 18.00

Dzień badania

W przypadku, gdy odbywa się ono w godzinach porannych - na badanie należy zgłosić się na czczo, nie należy nic jeść ani pić i zażyć tylko niezbędne leki.

W przypadku, gdy odbywa się ono w godzinach popołudniowych, w zależności od wieku pacjenta, należy się powstrzymać od jedzenia:

- niemowlęta – 2-3 godziny,
- dzieci – 3-4 godziny,
- nastolatki – 4-5 godzin.

Należy także:

- rano zażyć 2 kapsułki środka ułatwiającego wydalanie gazów jelitowych
- zadbać o wypróżnienie
- pić tylko tyle, by ugasić pragnienie.

Nie należy oddawać moczu przed badaniem.

USG w kierunku refluksu żołądkowo - przelykowego u dzieci

W dniu badania należy być na czczo. Należy wziąć ze sobą na badanie wodę, sok lub mleko bez kaszy (ilość w zależności od wieku pacjenta, np. niemowlęta ok. 200 ml).

USG jamy brzusznej z oceną pęcherza moczowego

W dniu badania należy być na czczo z pełnym pęcherzem moczowym. Należy wypełnić pęcherz moczowy pijąc nieduże ilości płynów przez 3-4 godziny.

USG jamy brzusznej z oceną odźwiernika

Przed badaniem należy być 2-3 godziny na czczo.

USG głowy przez otwarte ciemięczko (przezciemiączkowe)

Badanie wykonujemy bez przygotowania.

USG innych narządów

Nie wymagają specjalnego przygotowania.